

患者・家族（介護者）への安全管理上の注意事項一覧

◇ 患者・家族（介護者）共通、 ☆ 主に家族（介護者）	
投与後 2日間	<p>【投与前後での注意】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 本剤投与前の絶食は不要である。カルシウム剤を長期投与されている場合には、高カルシウム血症ではないことを確認すること。 <p>【日常生活での注意】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 注射当日を含み投与後数日間は、十分な水分を摂取する。 ◇ けがをした場合には、こぼれた血液をきれいに拭き取り洗い流す。 ◇ 出血の際は、トイレットペーパーできれいに拭き取ったうえでトイレに流す。 ☆ 患者の尿や糞便に触れる可能性がある場合、また、これらで汚染された衣類等を取扱う場合には手袋を着用すること。（家族・介護者） <p>【排尿・排便時の注意】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 男性の方も坐位で排尿する。 ◇ 尿がこぼれた場合は、トイレットペーパーできれいに拭き取ったうえでトイレに流す。 ◇ 使用後のトイレ洗浄は2回する。
	<p>【日常生活での注意】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 患者の血液に触れた場合や作業後は、必ず石鹸を用い手をよく洗う。 <p>【洗濯での注意】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 着用した衣類などの洗濯は、患者以外の人の衣類と別にし、血液や尿が付着したシーツ類や下着類は、十分にすすぐ。 <p>【排尿・排便時での注意】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 排尿・排便後は、必ず手をよく洗う。 ◇ 患者の排泄物に触れた場合は、必ず石鹸を用い手をよく洗う。 <p>【オムツ・導尿カテーテル等を使用している場合の注意】</p> <ul style="list-style-type: none"> ☆ 尿失禁のある患者の場合はビニール製のシーツを使用することも推奨される。（家族・介護者） ◇ 導尿カテーテルを使用する場合、尿パック中の尿はトイレに捨て、水を2回流し、処理後はよく手を洗う。 ◇ 家庭で使用したオムツは、ビニール袋に入れ内容物が漏れないように封入して、一般ごみとして処理する。
	<p>投与後 1年間 (避妊は2年)</p> <p>【日常生活での注意】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 授乳中の母親の場合、授乳を中止する。 ◇ 投与後2年間は避妊する。 ◇ 患者情報カードを携帯する。（付録5 参照） <ul style="list-style-type: none"> ・ 他科または他院にて治療を受ける場合には患者情報カードを提示し本治療を受けている旨、医師に伝える。